Communications.

Nouveaux Coléoptères de la faune française

(cinquième note) [1]

par le Dr H. Normand.

Euconnus fuxeensis, nov. sp. — *Rufo-castaneus, pubescens, capite transverso, thorace angustiore; antennarum articulis 1-7 elongatis, 8-10 quadratis, 11 elongato, clava quadriarticulata; elytris valde punctatis, basi foveolatis.* — Long. : 1,4-1,5 mill.

Entièrement d'un roux ferrugineux, avec les pattes et les palpes un peu plus clairs; couvert d'une pubescence jaune, longue et assez dense, couchée sur les élytres, un peu redressée et plus fournie aux tempes et au corselet. Tête transverse, un peu déprimée entre les antennes, finement ponctuée, plus étroite que le corselet; yeux assez gros, à facettes volumineuses; antennes longues, dépassant l'épaule en arrière, remarquables par leur massue nettement quadriarticulée et la forme allongée de leurs sept premiers articles : 1 et 2 presque deux fois plus longs que larges, plus épais que les suivants; 3-7 de moitié plus longs que larges, 4 et 6 de dimensions un peu moindres; 8, 9 et 10 carrés, plus épais; 11 allongé, conique, à base arrondie. Palpes longs, les premiers articles filiformes, l'avant-dernier épaissi, deux fois plus long que large. Corselet finement ponctué, globuleux, carré, rétréci en arrière, à base ornée d'un sillon à fond inégal et séparé par une carinule d'une fovéole latérale. Élytres presque deux fois plus larges que le corselet, dilatés latéralement, couverts de gros points assez denses mais peu profonds; fossettes basales, larges, courtes, profondes; un petit sillon, peu apparent, accompagne en outre



Euconnus fuxeensis Normand.

[1] *Bull. Soc. ent. Fr.* [1906], pp. 105 et 291; [1907], pp. 121 et 272.

la base de la suture qui est un peu proéminente. Pattes allongées, à fémurs légèrement renflés. Dessous pubescent; carène mésosternale longue, tranchante et légèrement échancrée au milieu.

Cet insecte, dont la forme rappelle celle de l'*Euconnus intrusus* SCHAUM, appartient au groupe des *Euconnus* (*Tetramelus*) ayant la tète courte, plus étroite que le corselet, la massue antennaire nettement accusée. Ces caractères le rapprochent de l'*E. Schiœdtei* KIESW., dont l'éloignent sa taille plus petite, ses caractères antennaires, sa ponctuation élytrale, etc.

J'ai capturé quelques exemplaires de ce nouvel *Euconnus* en criblant la mousse au pied des arbres à Ganac et à Serres, petits villages de la banlieue de Foix (Ariège), en avril et mai 1907.

Troglorrhynchus (Solariella) Gestroi SOLARI var. **Clermonti,** nov. — Troglorrhyncho Gestroi SOLARI *simillimus, sed elytris angustioribus, parallelis, levius punctatis, pilis corporis magis erectis.*

Semblable au *T. Gestroi* SOLARI, dont il présente les principaux caractères, mais dont il diffère par les quelques points suivants : forme un peu plus élancée, corselet moins arrondi, élytres plus parallèles, plus atténués postérieurement, moins grossièrement ponctués; pubescence du corselet et des élytres moins couchée, légèrement redressée.

Un seul individu, pris sur une racine de Platane, à Morcenx (Landes), par M. J. CLERMONT, le 15 décembre 1907.

Notre collègue, à qui je suis heureux de dédier cette intéressante découverte, a eu l'amabilité de me communiquer son unique exemplaire. Lui trouvant les plus grandes affinités avec le *T. Gestroi* SOLARI, j'ai prié M. DODERO de le comparer au *type* de la collection SOLARI et c'est grâce à son concours que j'ai pu identifier ce Curculionide que de nouveaux matériaux permettront peut-être de considérer comme une espèce distincte.

Cette capture est d'ailleurs remarquable et il est fort intéressant de voir un type de la faune hypogée de l'Italie méridionale se retrouver, à peine modifié, dans une région qui en est aussi éloignée que les Landes et où aucun Curculionide aveugle n'avait encore été signalé (1).

(1) Il est probable que les représentants de la faune hypogée sont bien plus nombreux et moins localisés qu'on ne le croit généralement. Je signalerai, à ce sujet, la capture que je viens de faire à Tlemcen (départ. d'Oran), des *Leptotyphlus Grouvellei* FAUVEL, *Euconnus* (*Leptocharis*) *Revelierei* REITT. et *Anommatus duodecimstriatus* MÜLL., espèces dont l'aire de dispersion se trouve ainsi considérablement agrandie.